

レジメン名 アフリベルセプト ベータ+FOLFIRI療法

| | |
|----------|------|
| 対象患者 | 大腸がん |
| 1サイクルの期間 | 14日 |
| 催吐性リスク | 中等度 |

| 投与順 | 注射薬 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|------|------|
| ① | アフリベルセプト ベータ 生理食塩液 | 4mg/kg 100mL | 1時間 | Day1 |
| ② | パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液 | 0.75mg 9.9mg 100mL | 30分 | |
| ③ | レボホリナート 生理食塩液 | 200mg/m ² 250mL | 2時間 | |
| ④ | イリノテカン 生理食塩液 ③と④は同時投与 | 150mg/m ² 250mL | 90分 | |
| ⑤ | フルオロウラシル 生理食塩液 | 400mg/m ² 50mL | 5分 | |
| ⑥ | フルオロウラシル 生理食塩液 | 2400mg/m ² | 46時間 | |

| 内服薬 | 1日量 | 用法 | 内服日 |
|-----------|------|-----|----------------------|
| 炭酸水素ナトリウム | 1.8g | 毎食間 | Day1~4※ ¹ |