

## レジメン名 ベバシズマブ+CAPIRI療法

対象患者	大腸がん
1サイクルの期間	21日
催吐性リスク	中等度

投与順	注射薬	投与量	投与時間	投与日
①	ベバシズマブ 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	90分(初回) 60分(2回目) 30分(継続)	Day1
②	パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 9.9mg 100mL	30分	
③	イリノテカン 生理食塩液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	90分	

内服薬	1日量	用法	内服日
炭酸水素ナトリウム	1.8g	毎食間	Day1~4
カペシタビン	1600mg/m <sup>2</sup>	朝・夕食後	Day2~15※ <sup>2</sup>

## 【カペシタビン投与量】

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.26m <sup>2</sup> 未満		
1.26m <sup>2</sup> 以上1.31m <sup>2</sup> 未満	900mg	1800mg
1.31m <sup>2</sup> 以上1.69m <sup>2</sup> 未満	1200mg	2400mg
1.69m <sup>2</sup> 以上1.76m <sup>2</sup> 未満		
1.76m <sup>2</sup> 以上1.88m <sup>2</sup> 未満	1500mg	3000mg
1.88m <sup>2</sup> 以上2.07m <sup>2</sup> 未満		
2.07m <sup>2</sup> 以上2.26m <sup>2</sup> 未満	1800mg	3600mg
2.26m <sup>2</sup> 以上		

※<sup>2</sup> Day1夕食後から開始の場合はDay15朝食後まで服用